

VLIV GEOPATOGENNÍCH ZÓN NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA




Václav Nečas, Státní energetická inspekce, Brno, Československo

Viac informácií o Geopatogénnych zónach www.dracie-zily.sk

Některé studie, uveřejněné v posledních letech, upozorňují na negativní vliv dlouhodobého pobytu člověka v místech výskytu geopatogenních zón /GPZ/ na jeho zdraví. V předložené studii jsme se zabývali podobnou problematikou zejména s ohledem na přesnější kvantifikaci uvedeného pole.

Pod pojmem "geopatogenní zóna" /GPZ/ rozumíme prostor se změněnou intenzitou /diskontinuitou/ dosud blíže neznámého pole fyzikálního původu, které citlivá osoba /např. sensitiv/ vnímá a může indikovat např. pomocí vhodného detektoru. Diskontinuita takto indikovaného pole v prostoru se projevuje velmi ostře, přechodem, definovatelným s centimetrovou přesností. V půdorysu je možno zóny GPZ charakterizovat jako pásy či jako pruhy. Jejich šířky bývají různé, nejčastěji se pohybují v rozmezí 20 - 80 cm. Zóny GPZ se nacházejí nepravidelně, ale poměrně hustě v terénu včetně lidských sídel. Často dochází k jejich jedno- nebo vícenásobnému křížení. Příklad zjištěného rozmístění zón GPZ v jedné místnosti domu je uveden na Obr. 1. Tam, kde to bylo možné ověřit, /několik desítek případů/, jsme zjistili v místech indikovaných GPZ podpovrchové geologické nehomogenity, dané výskytem podzemní vody nebo změnou homogenity pevných hornin.

(Zde se nachází nákras půdorysu lůžka s vyznačenými pásy, označený jako Obr. 1)



Obr. 1

Jak bylo ověřeno na hloubkových sondách, geologické nehomogenity, projevující se jako zdroj GPZ, se nacházely pod povrchem země do maximální hloubky asi 50 m. /Největší ověřená hloubka činila 45 m/.

Po delším zácvičku se podařilo subjektivně kvantifikovat i rozdílnou intenzitu jednotlivých GPZ. Byla k tomu použita pětibodová stupnice, v níž 5 bodů vyjadřovalo maximální intenzitu jedné GPZ. Rozdílná intenzita GPZ byla pozorována zvláště u zón, souvisejících s výskytem podzemní vody; u ostatních zjištěných zón se intenzita jevila vždy stejně, na maximální hodnotě 5 bodů. V místech křížení zón se však intenzita GPZ aditivně zvyšovala.

Ve studiu vlivu popsaných GPZ na zdraví člověka, bylo zahrnuto 78 bytů /rodin/ v různých lokalitách, ve kterých žilo 205 osob. Soubor byl vybrán náhodně /ne však ve statistickém smyslu slova/; jeho základem se stali jedinci, kteří si autorovi stěžovali na zdravotní potíže. Soubor byl pak doplněn zbývajícími členy jejich rodin. Charakteristika zdravotního stavu všech pokusných osob vycházela jednak z popisu jejich subjektivních potíží, jednak /u všech závažných onemocnění/ z odborných lékařských nálezů. Ve všech bytech byl proveden průzkum výskytu GPZ, které byly graficky zachyceny do podrobných plánků. Do stejných plánků byla zaznamenána místa trvalejšího pobytu jednotlivých osob, zvláště jejich lůžek a to s uvedením orientace dotyčných osob ve spánku.

Ze získaných výsledků uvádíme jen jako příklad následující:

Ukázalo se, že u pokusných osob se vyskytovaly zdravotní potíže právě jen v těch orgánech, které byly trvaleji vystaveny lokálnímu působení GPZ. Přitom bylo podstatné, že koincidence místa výskytu GPZ a určitého poškození orgánu v daném místě se dlouhodobě nacházejícího, se vyskytovala prakticky ve všech případech. U pěti osob, jejichž lůžka byla zcela mimo vliv GPZ, se nevyskytovaly žádné zdravotní obtíže. Jen jediná osoba z celého souboru ostatních, které byly pod vlivem GPZ, byla /po devíti letech pobytu v zóně GPZ/ rovněž bez potíží.

Bylo zjištěno, že intenzita GPZ souvisí s výskytem určitého druhu onemocnění. Následuje tabulka 1, v níž je uvedena průměrná intenzita GPZ u dílčího souboru v bodech.

Druh onemocnění	intenzita GPZ
Rýma chronická	4,6
Křečové žíly	4,9
Zrakové poruchy	5,6
Poruchy spánku	5,6
Chronická angína	5,6
Choroby dolních cest močových	5,7
Bolesti hlavy	6,0
Choroby horních cest močových	6,0

Druh onemocnění	intenzita GPZ
Postižení dolních končetin	6,1
Neurotická onemocnění	6,4
Dýchací soustava	6,9
Trávicí soustava	6,9
Páteř a horní končetiny	7,0
Onemocnění jater	7,0
Ženské pohlavní orgány	7,2
Srdeční onemocnění	7,4
Anemie	8,0
Onemocnění žlučníku	8,1
Celk. silný reumatismus	9,6
Nádorová onemocnění	9,6

Z uvedeného přehledu je vidět, že působení GPZ je určitým způsobem specifické.

U pokusného souboru se dále projevilo, že vznik určitého onemocnění závisí také na délce doby, po kterou se osoba v GPZ trvale zdržovala. Viz Tab. 2.

Strana 143:

143

Tabulka 2

Druh onemocnění	pobyt /let/
Appendix	4,5
Onemocnění jater	5,2
Neplodnost	6,3
Bolesti hlavy	6,7
Trávicí ústrojí	7,2
Rýma chronická	7,4

Druh onemocnění	pobyt /let/
Zrakové poruchy	7,5
Poruchy spánku	7,9
Neurotická onemocnění	8,0
Dýchací soustava	8,3
Chronická angína	8,7
Ženské pohlavní orgány	8,8
Močové ústrojí	9,0
Onemocnění žlučníku	9,0
Ledvinová onemocnění	9,8
Dolní končetiny	10,0
Celkový silný reumatismus	10,5
Křečové žíly	10,7
Anemie	11,0
Srdeční onemocnění	12,6
Nádorová onemocnění	20,6

Vznik prvních příznaků onemocnění se začal projevovat až za určitou dobu působení GPZ. Zmíněná doba byla u různých onemocnění různě dlouhá. V následujícím období se již projevené příznaky zvyrazňovaly.

Z popsaných výsledků vyplývá, že GPZ představují u člověka významný evidentně primární patogenní faktor, který souvisí s výskytem celé řady onemocnění. Další charakteristiku příslušných vzájemných vztahů bude možno provést po dokončení podrobného rozboru materiálu, který je v současné době ve spolupráci s lékaři prováděn. Pokud jde o mechanismus působení, zdá se, že GPZ obecně oslabuje část organismu, na níž působí, snižuje její adaptabilitu, zvyšuje dispozici k onemocněním a zesiluje škodlivé působení jiných zevních a vnitřních vlivů /např. zvyrazňuje skryté vrozené vady, zvyšuje nepříznivý vliv kouření, stresů, chemizace, apod./ Významným praktickým poznatkem je, že po odstranění trvalého lokálního vlivu GPZ /např. přemístěním lůžka nemocného mimo příslušnou zónu/ docházelo u pokusných osob za poměrně velmi krátkou dobu k markantnímu zmírnění zdravotních obtíží a v některých případech k postupnému objektivně ověřenému uzdravení. Předložená studie nemá za cíl formulovat definitivní závěry, ale má především upozornit na závažnost problematiky a to jak z humánního hlediska pro každého z nás, tak i z hlediska jejího celospolečenského efektu.

SUMMARY: Influence of geopathogenic zones on the health of man

In connection with the health of man the so-called "geopathogenic zones" /GPZ/, still not much known field of physical origin, which could be indicated by some trained people, was examined on the set of 205 persons. Detailed analysis of GPZ locations /zones appearing as a narrow strips in the ground projection/ was also carried out. It came out that any part of the body being under the influence of GPZ suffered an illness. The type of illness looks

somewhat specific in dependence on the GPZ intensity and the duration of its impact. The state of organism has been improved when people moved themselves with their beds into a GPZ free places. In general, GPZ synergizes negative impact of various stresses.